## AVERTISSEMENTS DLP21-8 TECHNIQUES AGRICOLES

DES STATIONS **D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES** 

PUBLICATION PÉRIODIQUE -

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL 34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42 Nº 15 - 18 août 1980

ABONNEMENT ANNUEL 60 F. C.C.P. Montpellier 5238-57

faibles dans l'Auda (est) mais plus abondantes dans l'onest de ce départument? v I G N E cet inutile de tralter acqueil en D I v entena madant la prandere quinzaine

du Rhône, entre 20 et 50 mm dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, Elles pont plus

EUDEMIS -

Le 3ème vol d'eudémis se manifeste avec un retard de quelques jours. Les pontes n'ont été décelées en quantité notable que les 12 et 13 août en situations précoces (Perpignan (66) - Marseillan (34) - Vias (34)) et quelques sites en Costières du Gard. Les pontes s'intensifient depuis cette date dans d'autres situations comme Montpellier-Méjanelle, Contre la phytophicy on effectue région du muscat de Lunel.

Un traitement est conseillé dans les situations favorables à l'évolution de ce ravageur, en particulier dans les vignes où les dégâts ont été relativement importants à la suite du 2ème vol, soit à la suite d'une absence de protection ou d'applications mal exécutées.

Le choix de la période d'intervention sera fait en tenant compte de l'évolution locale du ravageur et de son importance : le repérage des pontes est toujours vivement conseillé.

Les périodes d'intervention préventive se situeront des le 19/20 août dans les situations précoces, citées ci-dessus, et s'étendront progressivement aux autres situations du vignoble languedocien. Le décalage d'intervention sera à observer en situations tardives.

Cochylis et Eulia ont été décelées dans certaines situations de l'Hérault et sur

- Si des traitements ont été appliqués avant les fortes pluies du 15 août, il convient de La protection contre la teigne du poirugu est à enintemile. les renouveler.

- Le recours au poudrage est préconisé en cas de forte végétation, afin de mieux atteindre les grappes.

## MILDIOU -

Un traitement dit de couverture pourra être appliqué, en vue de favoriser la bonne tenue du feuillage, souhaitée par suite du retard végétatif constaté. Les produits classiques à base de cuivre sont plus spécialement recommandés étant donné leur rémanence. lindane ('D g m.a./al), judge'à mi-septembre, à la cadence de 10. - 12 jours, en vue d'assurer

## BOTRYTIS -

La période de vendanges s'annonce tardive pour le Languedoc. Un bon état sanitaire des grappes "s'impose: "L'application de produit spécifique anti-pourriture est conseilléedans les situations favorables au développement de cette maladie. Se reporter à la liste des produits déjà publiée. Les appareils à flux d'air devront être utilisés de P,369

much be disconstilled.

1.			1
/	ARBORICULTURE	FRUITIERE	1
1			1

Les pluies du 15 août ont rendu nécessaire le renouvellement de la protection contre le carpocapse, la tordeuse orientale, l'eulia (sur l'est montpelliérain) et capua; ces deux derniers ravageurs étant responsables de dégâts cansés à l'épiderme des fruits.

Les précipitations se situent entre 40 et 80 mm en Cévennes gardoises et vallée du Rhône, entre 20 et 50 mm dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Elles sont plus faibles dans l'Aude (est) mais plus abondantes dans l'ouest de ce département.

De très faibles captures de cératites ont été notées mendant la première quinzaine d'août. Il est inutile de traiter actuellement contre ce ravageur.

## MALADIES DE CONSERVATION DES POMMES ET DES POIRES -

Deux ou trois traftements sont conseillés avant cueillette (le dernier huit jours avant celle-ci) à l'aide de bénomyl (30 g m.a./hl), carbendazime (30 g m.a./hl) ou méthylthiophanate (70 g m.a./h1).

Contre le phytophtora on effectue sur les parties basses (jusqu'à 1 mètre du sol) une pulvérisation à base de captafol, ou folpel, ou captane, ou mancozèbe, ou tobylfluanide. un so mailuin "l'a reidorque) constructir and amshall hacoon to

Contre le rhizopus, sur fruits mûrissants, l'intérêt de l'utilisation de l'iprodione est à nouveau conseillée.

the charter do its provide d'il tervention so trait as trait de la l'aborde de l'aborde et l'aborde de in the service of the section and a section and a section of the section of the section of

DACUS - A THE DESART OF ACCUSE AND ANOTHER OF BUILDING METERS OF THE COMMENT AND ACCUSE AND ACCUSE

De très faibles prises, localement dans le Gard, ne justifient pas un traitement tions ou viewele languedecten. Le décalage d'in généralisé.

CULTURES LEGUMIERES

La protection contre la teigne du poireau est à maintenir.

Selective is apprinted as amporer of -PEUPLIERS /

GRANDE SAPERDE .-

LIGHT FLOR DOG

Effectuer un traitement sur les troncs jusqu'à 3 mètres du sol, à l'aide de . lindane (30 g m.a./hl), jusqu'à mi-septembre, à la cadence de 10 - 12 jours, en vue d'assurer la protection.

Respecter strictement les délais avant récolte

in praitement d'e de couverture pourra être

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE, CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

Contract to the second

- 001033

Tirage du 18 août 1980 1300 exemplaires

as america in think 71 ally said

V.LAGAUDE